



Los derivados de la sangre son los responsables del contagio del sida en los hemofílicos. En España hay tres mil infectados.

MILLONES PARA LOS MÉDICOS

Se calcula que, en España, los infectados directa o indirectamente por sangre o sus derivados, están en torno a los tres mil. No sólo acabaron con sida los que recibieron la medicación o la sangre contaminada, sino que, a veces, también le ocurrió a sus cónyuges o a sus hijos. Y es que muchos hemofílicos no fueron advertidos durante años de que podrían estar contagiados. Hicieron una vida normal y transmitieron el virus a sus parejas o, simplemente, tuvieron hijos con la enfermedad. Pedro Tocino no supo que tenía sida hasta 1990, tres años más tarde de que, oficialmente, se di-

jera que los derivados de la sangre eran los responsables del contagio del sida en los hemofílicos. De los tres mil, se calcula que ya han muerto en España más de mil doscientos. Muchos hemofílicos contagiados están convencidos de que había médicos que lo sabían. *“Michael Repiso afirmó que tenía pruebas de que médicos españoles habían cobrado varios cheques de cinco millones de pesetas de los laboratorios y que estos médicos sabían que los medicamentos que suministraban estaban contagiados con el sida”*, aseguró una médico que estuvo presente en la reunión que el abogado norteamericano Repiso, junto con el ex presidente del Senado, José Federico de Carvajal, y el hijo de éste, Pablo de Carvajal, mantuvieron con el abogado Juan R. Menéndez-Tolosa. La médico le contestó que, si tenía pruebas, tendría que denunciarlo y que, en cualquier caso, ella informaría de sus afirmaciones al Consejo Superior de Médicos. Ni Repiso ni Carvajal quisieron hacer declaraciones a **interviú** al salir de la citada reunión.